

ENDLICH eine Fettreduktionsmethode, die Ihren Lebensstil NICHT BEEINTRÄCHTIGT

Das Problem mit der Taille

„Rettungsringe“ oder Bauchfett los zu werden, ist oft schwierig. Egal, ob Sie viel, wenig oder gar keinen Sport treiben, Sie möchten einfach so gut wie möglich aussehen. Aber Fettdepots können hartnäckig sein. Hier kann die LipoSonix2-Behandlung helfen.

Fettreduktion ohne Operation

Die LipoSonix2-Behandlung ist ein nicht chirurgisches Verfahren zur Reduktion von Fettpölsterchen, mit dem unerwünschtes Fettgewebe im Taillenumfang mit einer etwa einstündigen Behandlung beseitigt werden kann. Der Taillenumfang wird um durchschnittlich 2,8 cm reduziert, was eine Konfektionsgröße ausmachen kann. Ergebnisse und Behandlungsdauer können von Person zu Person variieren. Ergebnisse zeigen sich normalerweise nach 8 bis 12 Wochen.




LipoSonix2 zugelassen von der amerikanischen Gesundheitsbehörde FDA zur Fettreduktion. CE Zulassung der europäischen Gesundheitsbehörde für die Behandlung von Bauch, Hüfte, Gesäß und Außenschenkel.



Dr. Reinhard Höfner ist ein anerkannter Experte auf dem Schönheitssektor.

Zertifizierte und zugelassene Praxis nach dem neuen ÄsthetikOP Gesetz

Höfner DR. REINHARD
EINFACH SCHÖN



Hautzentrum Dr. Höfner
Taubenmarkt 1 - 4020 Linz
Tel. 0732 / 78 40 09

www.hautzentrum.at

FETTREDUKTION

OHNE OPERATION mit LIPOSONIX2

- 1 Behandlung
- 1 Stunde
- 1 Konfektionsgröße schlanker



Sichtbare Ergebnisse gewöhnlich in 8 bis 12 Wochen feststellbar


SO FUNKTIONIERT DIE LIPOSONIX2-BEHANDLUNG

Bei der LipoSonix2-Behandlung wird das Fettgewebe ohne Operation mit Hilfe hochintensiver fokussierter Ultraschallenergie reduziert.

Ihr Arzt setzt den Behandlungskopf des LipoSonix2-Geräts auf den Behandlungsbereich auf. Dann wird hochintensive gebündelte Ultraschallenergie auf das unerwünschte Fett gerichtet.

Die Haut bleibt unverletzt während die unmittelbar unter der Haut liegenden Fettzellen dauerhaft zerstört werden.

Das behandelte Fett wird vom Körper dauerhaft beseitigt – und zurück bleibt eine schmalere, besser konturierte Taille.



Resultate, nach LipoSonix2-Behandlung, die sich sehen lassen können...



vor der Behandlung...



... 8 Wochen danach, 5 cm Reduktion

... 8 Wochen nach der Behandlung

... 8 Wochen danach, 4,1 cm Reduktion

HÄUFIGE FRAGEN

Mit welchen Ergebnissen kann ich rechnen?


Bei Studien zeigte sich eine Reduktion des Taillenumfangs um durchschnittlich 2,8 cm, was eine Konfektionsgröße ausmachen kann. Die Ergebnisse können individuell unterschiedlich ausfallen.

Ab wann sind Ergebnisse sichtbar?

Bei den meisten Patienten sind die Spitzenergebnisse nach 8 bis 12 Wochen sichtbar. So lange braucht der Körper, um die behandelten Fettzellen auf natürlichem Wege abzubauen.

Ist die LipoSonix-Behandlung sicher?

Die Entwicklung des LipoSonix2-Systems basiert auf über einem Jahrzehnt an Forschungsanstrengungen und Tests. Das Verfahren weist ein gut definiertes Sicherheitsprofil auf.



Nach erfolgter Behandlung und Zerstörung von Fettgewebe werden das freigesetzte Fett und die Zelltrümmer im Rahmen normaler Stoffwechselprozesse vom Körper abgebaut.

Gibt es Nebenwirkungen?

Nach der Behandlung kann es zu einer vorübergehenden Rötung, Blutergüssen und Schwellungen kommen.

Wie fühlt sich die Anwendung an?

Während der Behandlung können leichte Beschwerden wie Schmerzen, ein Kältegefühl, Kribbeln, Prickeln, oder ein Wärmegefühl verspürt werden.

Wie muss ich mich nach der LipoSonix-Behandlung verhalten?

Es gibt keine besonderen Vorschriften. Die Nachsorge liegt jedoch im Ermessen von Dr. Höfner.

Wie kann ich herausfinden, ob die LipoSonix2-Behandlung für mich geeignet ist?

Dr. Höfner kann in einem Beratungsgespräch feststellen, ob die LipoSonix2-Behandlung für Sie geeignet ist.

MODERNSTE TECHNOLOGIE FÜR IHRE PERSÖNLICHEN ANFORDERUNGEN

Bei der LipoSonix2-Behandlung wird unerwünschtes Fettgewebe (Rettungsringe und Bauch) mit Hilfe von modernster Ultraschalltechnologie gezielt zerstört.

Weil dafür kein operativer Eingriff erforderlich ist, gibt es praktisch keine Ausfallzeit. Diese Behandlung beruht auf über 10 Jahren Forschungsarbeit; Sie können sich also auf die LipoSonix2-Behandlung verlassen, wenn Sie Ihren Taillenumfang reduzieren möchten.



Markieren des Behandlungsrasters...



... die nichtbehandelbaren Bereiche werden mit x markiert, die zu behandelnden Bereiche werden fortlaufend nummeriert

